



ANALYSES D'URINES

Examen Cyto Bactériologique des Urines

HYGIENE :



Se laver soigneusement les mains avec un savon antiseptique doux, bien les rincer et les sécher

Pour un homme : décalotter le gland et le nettoyer avec de l'antiseptique de type DAKIN (disponible en pharmacie)

Pour une femme : Faire une toilette intime minutieuse avec une lingette antiseptique par exemple imbibée de DAKIN (disponible en pharmacie). Nettoyer de l'avant vers l'arrière. Maintenir les lèvres écartées en urinant.

RECUEIL DES URINES :

Eliminer le premier jet d'urine* dans les WC

Recueillir le milieu de jet directement dans le flacon stérile : le flacon ne doit être ouvert qu'au dernier moment.



Revisser le bouchon à fond

Identifier le flacon avec Nom, Prénom, Date et Heure de recueil

Acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais (dans les 2h sinon conservation au réfrigérateur moins de 12 h)

(*) : 1^{er} jet Urine : son recueil peut être demandé pour l'analyse PCR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae dans un flacon séparé

Accolab Sud Est

Laboratoire de Villeurbanne 151, Avenue Roger Salengro 69 100 Villeurbanne Tél : 04 78 93 48 84 Fax : 04 78 89 54 08	Laboratoire des Abrets 38 rue Gambetta 38490 Les Abrets Tél : 04 76 32 22 19 Fax : 04 76 37 41 53	Laboratoire d'Heyrieux Place Paul Doumer 38540 Heyrieux Tél : 04 78 40 55 85 Fax : 04 78 40 55 81
--	---	---



ANALYSES D'URINES

Examen Cyto Bactériologique des Urines

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Nom : **Prénom :**

Date de naissance : / /

Date de prélèvement : / / **Heure :**

Mode de recueil :

- Miction en milieu de jet Sonde à demeure Sur collecteur (pose <30 min) Par sondage

Conservation au réfrigérateur : OUI NON

Contexte :

- Grossesse Chimiothérapie en cours Bandelette urinaire positive
- Bilan avant intervention chirurgicale Hospitalisation récente
- Insuffisance rénale (<30ml/mm) Malformation connue de l'appareil urinaire Greffe rénale
- Chirurgie récente sur l'appareil urinaire Présence d'une sonde double J Autre :

Renseignements cliniques :

- Douleur ou brûlures lorsque vous urinez Augmentation de la fréquence des mictions
- Douleur lombaire unilatérale Fièvre Sang dans les urines
- Absence de signes cliniques Contrôle après traitement

Prise d'antibiotiques avant recueil : OUI NON

Prise d'antibiotiques prescrite pour après le recueil : OUI NON